

## ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

### ЛЕСПЕНЕФРИЛ-ЛУБНИФАРМ

(LESPENEFRIL-Lubnypharm)

#### **Склад:**

діюча речовина: екстракт пагонів леспедези двоколірної (*Cormus Lespedeza bicolor Turcz.*) (1 : 4-5);

1 мл розчину містить екстракту пагонів леспедези двоколірної (*Cormus Lespedeza bicolor Turcz.*) (1 : 4-5) — 0,9 мл (екстрагент — етанол 70 % (об/об));

допоміжні речовини: вода очищена, анісова олія.

**Лікарська форма.** Розчин оральний.

**Основні фізико-хімічні властивості:** рідина від світло-коричневого до темно-коричневого кольору, зі специфічним запахом. Допускається наявність осаду.

#### **Фармакотерапевтична група.**

Засоби, що застосовуються в урології. Код АТХ G04B X.

#### **Фармакологічні властивості.**

**Фармакодинаміка.**

Комплекс біологічно активних речовин, що входять до складу лікарського засобу, сприяє збільшенню ниркової фільтрації, зменшує азотемію, прискорює виведення азотистих шлаків із сечею, збільшує діурез, посилює виведення натрію і меншою мірою — калію.

#### **Клінічні характеристики.**

##### **Показання.**

Лікарський засіб застосовувати дорослим як гіпоазотемічний і діуретичний засіб для симптоматичної терапії при хронічній нирковій недостатності.

### ***Протипоказання.***

Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу, вагітність, період годування груддю, захворювання печінки, алкоголізм, епілепсія, черепно-мозкові травми, захворювання головного мозку. Дитячий вік до 18 років.

### ***Особливі заходи безпеки.***

При застосуванні лікарського засобу слід дотримуватися рекомендацій лікаря.

### ***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

Через наявність у лікарському засобі етанолу його не можна застосовувати одночасно із дисульфірамом, седативними лікарськими засобами, неселективними інгібіторами моноаміноксидази, інсуліном, метформіном, сульфонамідами.

При одночасному призначенні кількох лікарських засобів потрібно враховувати наявність етанолу в препараті, оскільки він може змінювати чи посилювати дію інших лікарських засобів.

### ***Особливості застосування.***

При виникненні гіпонатріємії її слід компенсувати введенням препаратів, які містять іони натрію.

Лікарський засіб містить не менше 40 % етанолу. В максимальній разовій дозі лікарського засобу вміст етанолу становить не менше 4,7 г, в максимальній добовій дозі — не менше 18,8 г.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Леспенефрил-Лубнифарм протипоказаний у період вагітності або годування груддю.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Через наявність у лікарському засобі етанолу можливе зниження психомоторних реакцій, що слід враховувати при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

### ***Спосіб застосування та дози.***

Леспенефрил-Лубнифарм застосовувати всередину по 5-15 мл (1 чайна — 1 столова ложка) 3-4 рази на добу. Допускається розведення лікарського засобу водою перед вживанням.

Курс лікування — 3-4 тижні.

Проведення повторного курсу лікування можливе через 2-3 тижні лише після консультації з лікарем.

*Діти.*

Лікарський засіб не застосовувати для лікування дітей.

***Передозування.***

Симптоми передозування пов'язані з наявністю у лікарському засобі етанолу.

***Побічні реакції.***

Можливі алергічні реакції. Рідко лікарський засіб може спричинити гіпонатріємію, яку можна компенсувати введенням препаратів натрію.

***Термін придатності.***

3 роки.

***Умови зберігання.***

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

***Упаковка.***

По 100 мл у флаконі в пачці з картону.

***Категорія відпуску.***

Без рецепта.

***Виробник.***

АТ «Лубнифарм».

**Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.**

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16.