

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ПРИЧЕПИ ТРАВА

(BIDENTIS HERBA)

Склад:

діюча речовина: причепа трава (*bidentis herba*);

1 пачка містить причепа трави (*bidentis herba*) 40 г або 50 г;

1 фільтр-пакет містить причепа трави (*bidentis herba*) 1,5 г.

Лікарська форма. Трава.

Основні фізико-хімічні властивості: шматочки листя, стебел, бутонів і квіток, що проходять крізь сито з отворами діаметром 7 мм. Колір зелений, бурувато-зелений або зеленувато-фіолетовий з сірувато-жовтими включеннями. Запах слабкий. Смак гіркуватий, злегка в'яжучий (для пачок).

Порошкоподібна маса зеленого, бурувато-зеленого, зеленувато-фіолетового кольору з сірувато-жовтими включеннями. Запах слабкий. Смак гіркуватий, злегка в'яжучий (для фільтр-пакетів).

Фармакотерапевтична група.

Дерматологічні препарати. Код АТХ D11A X.

Фармакологічні властивості.

Біологічно активні речовини трави чинять сечогінну, потогінну, протизапальну, антиалергічну, жовчогінну і бактерицидну дію.

Клінічні характеристики.

Показання.

Захворювання шкіри алергічного характеру, діатези, піодермії, псоріаз, екземи, нейродерміти. Захворювання сечовивідних шляхів, порушення обміну речовин, алергії, застудні захворювання (ГРЗ, грип) (у комплексному лікуванні).

Протипоказання.

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Застосовувати за призначенням лікаря тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

2 столові ложки трави помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.

Приймати у теплому вигляді 2-3 рази на добу за 15-20 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років - по $\frac{1}{3}$ склянки; дітям віком 12-14 років - по $\frac{1}{4}$ склянки.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати у теплому вигляді 2-3 рази на добу за 15-20 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років - по 100 мл; дітям віком 12-14 років - по 50 мл.

Зовнішньо настій використовують для примочок та ванн.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти.

Внутрішньо препарат не призначають дітям віком до 12 років.

Передозування.

Можливе посилення побічних реакцій.

Побічні реакції.

При гіперчутливості до препарату можливі алергічні реакції (у тому числі гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри, кропив'янка).

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Приготовлений настій зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С не більше 2 діб.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 40 г або 50 г у пачках з внутрішнім пакетом, по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці з картону.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник.

АТ «Лубнифарм».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16.