

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ПРИЧЕПИ ТРАВА

Склад:

діюча речовина: причеви трава;

1 пакет містить причеви трави (*Bidentis herba*) 50 г.

Лікарська форма. Трава.

Основні фізико-хімічні властивості: шматочки листків, стебел, бутонів і квіток, що проходять крізь сито з отворами діаметром 7 мм. Колір зелений, бурувато-зелений або зеленувато-фіолетовий із бруднувато-жовтими краплями. Запах слабкий. Смак гіркотий, злегка в'язкий.

Фармакотерапевтична група. Дерматологічні препарати. Код АТХ D11A X.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Причеви трава містить флавоноїди (лютеолін-D-глюкопіранозид, бутеїн, сульфуретин, D-глюкопіранозид бутеїну), речовини дубильні конденсовані, каротин, кумарини (умбеліферон і скополетин), кислоту аскорбінову, олію ефірну (сліди) слиз, аміни, гіркоти, γ -лактони, мікроелементи. Цей комплекс біологічно активних речовин чинить сечогінну, потогінну, протизапальну, антиалергічну, кровоочисну, жовчогінну і бактерицидну дію. Водні витяжки з трави причеви покращують апетит та травлення, нормалізують порушений обмін речовин, знижують артеріальний тиск.

Фармакокінетика.

Не вивчалась.

Клінічні характеристики.

Показання.

Внутрішньо у комплексному лікуванні при порушенні обміну речовин, при захворюваннях

сечовивідних шляхів, при застудних захворюваннях (ГРЗ, грип); алергії.

Зовнішньо – при шкірних захворюваннях алергічного характеру, діатезах, піодермії, псоріазі, екземах, нейродермітах.

Протипоказання.

Індивідуальна чутливість до біологічно активних речовин, які містяться у лікарському засобі.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Безпека та клінічна ефективність лікарського засобу у період вагітності або годування груддю не вивчалися, тому призначати внутрішньо «Причепа траву» можна тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

2 столові ложки трави помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплом вигляді 2–3 рази на добу за 15–20 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по $\frac{1}{3}$ склянки; дітям 12–14 років – по $\frac{1}{4}$ склянки.

Зовнішньо настій застосовувати у вигляді примочок та ванн.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти.

Лікарський засіб не рекомендується застосовувати внутрішньо дітям віком до 12 років.

Передозування.

Можливе посилення проявів побічних реакцій.

Побічні реакції.

При гіперчутливості до препарату можливі алергічні реакції (у тому числі гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри, кропив'янка).

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Приготовлений настій зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С не більше 2 діб.

Зберігати у недоступному для дітей місці!

Упаковка.

По 50 г у пачці з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник/заявник.

ТОВ «Тернофарм».

***Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності/
місцезнаходження заявника.***

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Тел./факс: (0352) 521-444, <http://www.ternopharm.com.ua>.