

## ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

### ШЛУНКОВИЙ ЗБІР № 3

(STOMACHICAE SPECIES № 3)

#### **Склад:**

діючі речовини: 1 г збору містить: крушини кори (*Frangulae cortex*) 300 мг, кропиви листя (*Urticae folia*) 300 мг, м'яти перцевої листя (*Menthae piperitae folia*) 200 мг, валеріани кореневищ з коренями (*Valerianae rhizomata cum radicibus*) 100 мг, лепехи кореневищ (*Calami rhizomata*) 100 мг.

**Лікарська форма.** Збір.

**Основні фізико-хімічні властивості:** суміш неоднорідних шматочків темно-зеленого, сіро-бурого, темно-бурого кольору з оранжевими і жовтувато-білими включеннями.

**Фармакотерапевтична група.**

Засоби, що впливають на систему травлення та метаболічні процеси. Код АТХ А16А Х.

**Фармакологічні властивості.**

**Фармакодинаміка.**

Біологічно активні речовини збору спричиняють подразнення рецепторів слизової оболонки шлунка і кишечника, що зумовлює регулюючий вплив на функції, у тому числі моторику, зазначених відділів шлунково-кишкового тракту; чинять легку проносну, спазмолітичну, седативну, протизапальну, жовчогінну дію.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.** Спазми шлунково-кишкового тракту, хронічні гастрити та холецистити, дискінезії жовчних шляхів, запори – у складі комплексної терапії.

**Протипоказання.** Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Бронхіальна астма, запори неврогенного та ендокринного походження, спастичні запори, синдром «гострого» живота, апендицит, гострий гастроентероколіт, інші запальні процеси черевної порожнини, шлунка, кишечника; підвищена кислотність шлункового соку, кишкова

непрохідність; виразковий коліт; кровотечі шлунково-кишкові, маткові (не пов'язані з менструальним циклом), гострі пропасні стани, депресія та інші захворювання, що супроводжуються пригніченням діяльності центральної нервової системи.

**Особливі заходи безпеки.** У пацієнтів зі шлунково-стравохідним рефлюксом можливе посилення печії. Тривалий прийом препарату може призвести до ослаблення або відсутності проносного ефекту. Щоб запобігти звиканню, доцільно дотримуватися рекомендованого курсу лікування.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Можливе зниження ефективності антацидів, блокаторів  $H_2$ -гістамінових рецепторів (ранітидину, фамотидину).

**Особливості застосування.**

**Застосування у період вагітності або годування груддю.** Протипоказано.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.** Не впливає.

**Спосіб застосування та дози.**

1 столову ложку збору помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Застосовувати у теплом вигляді 2 рази на добу за 15-20 хв до їди: дорослим і дітям віком від 14 років – по ½ склянки, дітям віком

12-14 років – по ⅓ склянки. Перед застосуванням настій збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити

і настоювати 15 хв. Застосовувати у теплом вигляді 2 рази на добу за 15-20 хв до їди: дорослим і дітям віком від 14 років – по 1 склянці, дітям віком 12-14 років – по ½ склянки.

Приготовлений настій зберігати при температурі 8-15 °C не більше 2 діб.

Курс лікування – 20-25 днів. Повторні курси проводити після 10-12-денної перерви.

*Діти.* Препарат застосовувати дітям віком від 12 років за призначенням лікаря.

**Передозування.** Недотримання рекомендованих доз та тривале застосування (довше 2-х місяців) може призвести до колікоподібного болю у животі, нудоти, тенезмів, відчуття дискомфорту, діареї з метаболічними порушеннями, дегідратації, зниження функції ферментів кишечника, атонії товстого кишечника, а також спричинити відчуття пригніченості, підвищеної втомлюваності, сонливості, запаморочення, головний біль, брадикардію, біль у ділянці серця, підвищене згортання крові. Терапія симптоматична (промивання шлунка, застосування активованого вугілля, натрію сульфату).

**Побічні реакції.** Можливі алергічні реакції (у т.ч. кропив'янка, висипання та набряк шкіри, свербіж, гіперемія, контактний дерматит). Можливе виникнення колікоподібного болю у животі, порушення функції кишечника, печії, нудоти, брадикардії, аритмії, пригнічення емоційних реакцій, психічної депресії, головного болю, тривожності. При гіперчутливості до валеріани кореневищ з коренями можливе порушення сну та прояв протилежного збуджувального ефекту. При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

**Термін придатності.** 2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.** Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °C у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 75 г у пачках з внутрішнім пакетом;

по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник.** ПрАТ «Ліктрави».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.