

## ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

### БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ

#### **Склад:**

*діюча речовина:* брильянтовий зелений;

100 мл розчину містять брильянтового зеленого 1 г;

*допоміжна речовина:* етанол 60 %.

**Лікарська форма.** Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий.

*Основні фізико-хімічні властивості:* рідина інтенсивно зеленого кольору із запахом спирту.

#### **Фармакотерапевтична група.**

Антисептичні та дезінфікуючі засоби. **Код АТХ D08A X.**

#### **Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.*

Антисептичний засіб для зовнішнього та місцевого застосування. Чинить антимікробну дію. Лікарський засіб активний відносно грампозитивних бактерій.

*Фармакокінетика.*

Препарат місцевої дії. Даних про всмоктування у кров та участь у метаболічних процесах організму не виявлено.

#### **Клінічні характеристики.**

##### **Показання.**

Гнійно-запальні процеси шкіри (піодермія, фурункульоз, карбункульоз, блефарит) легкої форми, а також обробка операційного поля, шкірних покривів після операцій та травм.

### **Протипоказання.**

Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу.

### **Особливі заходи безпеки.**

Не допускати потрапляння препарату в очі.

*Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу - це може зашкодити здоров'ю.*

*Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.*

### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

При одночасному застосуванні з препаратами для зовнішнього застосування, які містять органічні сполуки, може денатурувати білки, утворювати нові сполуки.

Не сумісний з дезінфікуючими препаратами, які містять активний йод, хлор, луги (в тому числі розчин аміаку).

*При одночасному застосуванні будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікаря.*

### **Особливості застосування.**

Не слід допускати потрапляння розчину на слизові оболонки, оскільки спирт, що міститься в лікарському засобі, може спричинити опіки, сильне подразнення. Активність препарату суттєво зменшується у присутності сироватки крові.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Застосовують.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Не впливає.

### **Спосіб застосування та дози.**

Наносять на поверхню шкіри, при порушенні її цілісності охоплюють навколишні здорові тканини. При захворюваннях очей змазують краї повік.

*Діти.*

Застосовують.

***Передозування.***

Не спостерігалось.

***Побічні реакції.***

Алергічні реакції (свербіж, кропив'янка). При попаданні розчину на слизову оболонку ока виникає печіння, слезотеча, можуть з'явитися опіки.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.

***Термін придатності.*** 2 роки.

***Умови зберігання.***

Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

***Упаковка.***

По 20 мл або по 50 мл або по 100 мл у флаконах.

***Категорія відпуску.***

Без рецепта.

***Виробник/заявник.***

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка, вул. Корольова, б. 4.