

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування лікарського засобу**

**Гліцерол Євро**

**Склад:**

діюча речовина: glycerol;

1 супозиторій містить гліцерину 1 г або 2 г;

допоміжні речовини: желатин, вода очищена.

**Лікарська форма.** Супозиторії ректальні.

**Основні фізико-хімічні властивості:** свічки із желатинової маси, напівпрозорі, жовтого кольору, однорідні на вид, без запаху або зі слабким характерним запахом.

**Фармакотерапевтична група.**

Інші проносні засоби. Код ATX A06A X01.

**Фармакологічні властивості.**

**Фармакодинаміка.**

У чистому вигляді гліцерин має подразнювальну дію, яка зникає при додаванні води (до 30-50%), вазеліну, ланоліну. При застосуванні у вигляді ректальних супозиторіїв полегшує виведення калових мас. При введенні у пряму кишку гліцеринові супозиторії чинять легку подразнювальну дію на слизову оболонку та рефлекторним шляхом ініціюють процес дефекації.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Симптоматичне лікування запорів різної етіології (коли застосування пероральних препаратів неможливе).

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до гліцерину або до будь-якого інгредієнта препарату. Ниркова

недостатність, синдром подразненого кишечнику, кишкова непрохідність, апендицит, кровотеча, діарея, геморой у стадії загострення, тріщини заднього проходу, запальні захворювання, пухлини прямої кишки, недіагностований біль у животі, геморагічний ректоколіт.

### ***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

Супозиторії з гліцерином можуть послабити дію інших лікарських засобів, що застосовуються ректально. Необхідно дотримуватись кількагодинного інтервалу.

### ***Особливості застосування.***

Не рекомендується застосовувати супозиторії курсом лікування більше 1 тижня.

З обережністю застосовувати при порушенні функції нирок, алергії, нудоті, блюванні.

Перед та після застосуванням супозиторіїв слід ретельно вимити руки.

### ***Застосування у період вагітності або годування груддю.***

У період вагітності препарат можна застосовувати тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода.

Невідомо, чи екскретується гліцерин у грудне молоко, тому цей лікарський засіб слід застосовувати тоді, коли, на думку лікаря, очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для дитини.

### ***Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.***

Не впливає.

### ***Спосіб застосування та дози.***

Застосовувати по 1 супозиторію 1 раз на добу через 15-20 хвилин після сніданку.

Супозиторій вводити у пряму кишку та утримувати там протягом не менше 5 хвилин, якщо не відбувається випорожнення раніше. Залишки супозиторіїв виводяться з організму разом із каловими масами. При необхідності дозу можна збільшити до 2 супозиторіїв на добу.

Разова доза дорослим та дітям віком від 6 років: 1 супозиторій по 2 г або 2 супозиторія по 1 г.

Разова доза дітям віком від 2 до 6 років: 1 супозиторій по 1 г.

Лікування запорів не повинно перевищувати 7 днів.

### ***Діти.***

Дітям віком від 2 років препарат застосовувати у дозі 1 г гліцерину.

### ***Передозування.***

*Симптоми:* часте рідке випорожнення. Проходить самостійно після відміни препарату.

У разі передозування слід відмінити препарат.

### ***Побічні реакції.***

Описано деякі наслідки та симптоми, що зникають після завершення застосування, зокрема, ректальний дискомфорт, подразнення, печіння, коліки та спазми. Крім того, у рідкісних випадках може спричиняти гіперемію слизової оболонки прямої кишки, а у поодиноких випадках – невеликі кровотечі або виділення слизу.

Можливі алергічні реакції, біль, нудота, блювання, шлунково-кишкова кровотеча.

При тривалому застосуванні спостерігалися подразнення і неприємні відчуття у прямій кишці; іноді – катаральний проктит.

### ***Термін придатності.*** 3 роки.

### ***Умови зберігання.***

Зберігати при температурі не вище 25 °C. Зберігати у недоступному для дітей місці.

### ***Упаковка.***

По 6 супозиторіїв у термозапаяному блістері з білої непрозорої ПВХ плівки; по 1 або по 2 блістери.

### ***Категорія відпуску.*** Без рецепта.

**Виробник.**

Лабораторіус Басі - Індустрія Фармасьютіка, С.А.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

Парк Індустріал Мануель Лоуренсо Феррейра, Лотс 8, 15 та 16, Мортагуа, 3450-232, Португалія.