

## ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

### СОФОРИ ЯПОНСЬКОЇ НАСТОЙКА (TINCTURA SOPHORAE JAPONICAE)

#### **Склад:**

*діюча речовина:* настойка плодів софори японської (Fructus Sophorae japonicae) (1:2)  
(екстрагент - етанол 48 %);

1 флакон містить настойки плодів софори японської (Fructus Sophorae japonicae) (1:2)  
(екстрагент - етанол 48 %) 20 мл або 25 мл, або 40 мл.

**Лікарська форма.** Настойка.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозора рідина бурого кольору. Допускається утворення осаду.

**Фармакотерапевтична група.**

Антисептичні та дезінфікуючі засоби. Код АТХ D08A X.

#### **Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.*

Біологічно активні речовини, що містяться в плодах софори японської (рутин, софорозид, геністеїн, кемпферол, кверцетин та інші речовини), зумовлюють протизапальну, антимікробну та трофічну дію препарату, ущільнюють стінки судин та зменшують їх ламкість.

*Фармакокінетика.* Не вивчалась.

#### **Клінічні характеристики.**

##### **Показання.**

Гнійні запальні процеси (рани, трофічні виразки).

### ***Протипоказання.***

Індивідуальна підвищена чутливість до препарату.

### ***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

Поки що не відома.

### ***Особливості застосування.***

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Оскільки до складу препарату входить етиловий спирт, настоянку не рекомендується застосовувати жінкам у період вагітності та годування груддю.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Препарат не впливає на здатність керувати автотранспортом і виконувати іншу роботу, що потребує підвищеної концентрації уваги і швидкості психомоторних реакцій.

### ***Спосіб застосування та дози.***

Застосовують зовнішньо дорослим і дітям віком від 12 років при ранових процесах – у формі аплікацій під пов'язку та зрошень. Курс лікування залежить від форми, тяжкості захворювання, ефективності препарату, а також від характеру лікування (монотерапія або терапія в комплексі з іншими лікарськими засобами).

*Діти.*

Не застосовують дітям віком до 12 років.

### ***Передозування.***

Не встановлено.

### ***Побічні реакції.***

Алергічні реакції, включаючи почервоніння, висипи на шкірі, свербіж.

**Термін придатності.** 2 роки.

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 20 мл або по 25 мл, або по 40 мл у флаконах, укупорених пробкою та кришкою або пробкою-крапельницею та кришкою. По 20 мл або по 25 мл у флаконі, укупореному пробкою-крапельницею та кришкою, у пачці. По 40 мл у флаконі, укупореному пробкою та кришкою або пробкою-крапельницею та кришкою, у пачці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник.** ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75.

**Заявник.** ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

**Місцезнаходження заявника.**

69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75.