

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу
ЛЬОНУ НАСІННЯ
(Lini semen)

Склад:

діюча речовина: льону насіння (*lini semen*);

1 пачка містить льону насіння (*lini semen*) 100 г або 200 г.

Лікарська форма. Насіння.

Основні фізико-хімічні властивості: насіння сплюснуте, видовженої яйцеподібної форми, довжиною від 4 мм до 6 мм, шириною від 2 мм до 3 мм і товщиною від 1,5 мм до 2 мм; округле з одного кінця та загострене з іншого, з чітко помітним насінневим рубчиком. Насіннева шкірка від темно-червонувато-коричневого до жовтого кольору, гладенька і блискуча, при збільшенні – дрібнокомірчаста. Під шкіркою розміщується вузький білуватий ендосперм і зародок, який складається із двох великих плоских жовтуватих і маслянистих сім'ядолей.

Фармакотерапевтична група.

Засоби для лікування кислотозалежних захворювань. Код АТХ А02Х.

Фармакологічні властивості.

Біологічно активні речовини лікарського засобу чинять обволікаючу, протизапальну і легку проносну дію, вкриваючи тонким шаром слизові оболонки травного тракту та запобігаючи їх подразненню.

Клінічні характеристики.

Показання.

У складі комплексної терапії захворювань слизових оболонок травного тракту (ентерити, коліти, езофагіти, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки), запальних процесів шкіри (фурункульоз, абсцеси).

Протипоказання.

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Гострий та хронічний холецистит у стадії загострення; непрохідність кишечника.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

1 чайну ложку насіння залити 100 мл окропу і збовтувати протягом 15 хв, процідити. Внутрішньо застосовувати тільки свіжоприготований препарат у теплому вигляді 3 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим і дітям віком від 14 років – по ¼ склянки, дітям 12-14 років – по 2 столові ложки, 7-12 років – по 1 столовій ложці, 3-7 років – по 1 десертній ложці.

Слиз не зберігати.

Зовнішньо застосовувати сухе нагріте насіння у полотняних мішечках або свіжоперемелене, запарене у невеликій кількості окропу, у вигляді припарок при фурункулах та абсцесах для прискорення їх дозрівання.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти.

Застосовують дітям віком від 3 років за призначенням лікаря.

Передозування.

При передозуванні можлива діарея.

Побічні реакції.

Можливі алергічні реакції, при тривалому застосуванні – діарея та больовий синдром. При виникненні побічних реакцій слід припинити застосування лікарського засобу та звернутися до лікаря.

***Термін придатності.* 3 роки.**

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 100 г, 200 г у пачках з внутрішнім пакетом.

***Категорія відпуску.* Без рецепта.**

Виробник.

АТ «Лубнифарм».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16.

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного средства

ЛЬНА СЕМЕНА

(*Lini semen*)

Состав:

действующее вещество: льна семена (*lini semen*);

1 пачка содержит льна семян (*lini semen*) 100 г или 200 г.

Лекарственная форма. Семена.

Основные физико-химические свойства: семена сплюснутые, удлинённой яйцевидной формы, длиной от 4 до 6 мм, шириной от 2 мм до 3 мм и толщиной от 1,5 мм до 2 мм; округлые с одного конца и обостренные с другой, с четко различимым семенным рубчиком. Семенная кожура от темно-красновато-коричневого до желтого цвета, гладкая и блестящая, при увеличении – мелкоячеистая. Под кожицей размещается узкий беловатый эндосперм и зародыш, состоящий из двух больших плоских желтоватых и маслянистых семядолей.

Фармакотерапевтическая группа.

Средства для лечения кислотозависимых заболеваний. Код АТХ А02Х.

Фармакологические свойства.

Биологически активные вещества лекарственного средства оказывают обволакивающее, противовоспалительное и легкое слабительное действие, покрывая тонким слоем слизистые оболочки пищеварительного тракта и предохраняя их от раздражения.

Клинические характеристики.

Показания.

В составе комплексной терапии заболеваний слизистых оболочек пищеварительного тракта (энтериты, колиты, эзофагиты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки), воспалительных процессов кожи (фурункулез, абсцессы).

Противопоказания.

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата. Острый и хронический холецистит в стадии обострения; непроходимость кишечника.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Неизвестно.

Особенности применения.

Применение в период беременности или кормления грудью.

По назначению врача в том случае, когда польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Не влияет.

Способ применения и дозы.

1 чайную ложку семян залить 100 мл кипятка и взбалтывать в течение 15 мин, процедить. Внутрь принимать только свежеприготовленный препарат в теплом виде 3 раза в сутки за 30 мин до еды: взрослым и детям с 14 лет - по ¼ стакана, детям 12-14 лет - по 2 столовые ложки, 7-12 лет - по 1 столовой ложке, 3-7 лет - по 1 десертной ложке.

Слизь не хранить.

Наружно применять сухие нагретые семена в полотняных мешочках или свежемизмельченные, запаренные в небольшом количестве кипятка, в виде припарок при фурункулах и абсцессах для ускорения их созревания.

Длительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Дети.

Препарат применяют детям с 3 лет по назначению врача.

Передозировка.

При передозировке возможна диарея.

Побочные реакции.

Возможны аллергические реакции, при длительном применении – диарея и болевой синдром. При возникновении побочных реакций необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Срок годности. 3 года.

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения.

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка.

По 100 г, 200 г в пачках с внутренним пакетом.

Категория отпуска. Без рецепта.**Производитель.**

АО «Лубныфарм».

Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности.

Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Барвинкова, 16.