

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

СОСНИ БРУНЬКИ

(PINI GEMMAE)

Склад:

діюча речовина: сосни бруньки (*Pini gemmae*);

1 пачка містить: сосни бруньок (*Pini gemmae*) 30 г;

1 пачка містить: сосни бруньок (*Pini gemmae*) 75 г.

Лікарська форма. Бруньки.

Основні фізико-хімічні властивості: окремі бруньки або по кілька штук у мутовках, без стебла або з залишком стебла; колір зовні рожево-бурий, на зламі зелений або бурий; запах ароматний, смолистий; смак гіркуватий.

Фармакотерапевтична група. Засоби, які застосовують при кашлі та застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби. Код АТХ R05C A.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Біологічно активні речовини препарату стимулюють секреторну активність слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, чинять відхаркувальну дію, діють бактерицидно на патогенну мікрофлору носоглотки і ротової порожнини, а також мають слабкі сечогінні та потогінні властивості.

Клінічні характеристики.

Показання. Захворювання дихальних шляхів (хронічні бронхіти, пневмонії);

зовнішньо – при ларингітах, трахеїтах, ангіні (у складі комплексної терапії).

Протипоказання. Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Нефрити, нефрози, пієліти, гломерулонефрити, гепатити, нефропатії вагітних, бронхіальна астма.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Протипоказане застосування внутрішньо (може спровокувати ураження нирок).

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає.

Спосіб застосування та дози. 2 столові ложки бруньок помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані протягом 30 хв. Охолодити при кімнатній температурі 10 хв, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл. Застосовувати у теплому вигляді 3 рази на добу після їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по 1/3 склянки; дітям 12-14 років – по 2 столові ложки, 7-12 років – по 1 столовій ложці, 3-7 років – по 1 чайній ложці.

Підігрітий відвар застосовувати місцево для інгаляцій та полоскань. Перед застосуванням препарат збовтати.

Приготовлений відвар зберігати при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти. Препарат застосовувати дітям віком від 3 років.

Передозування. Передозування та тривале застосування спричиняють запалення слизових оболонок травного тракту, сечовивідних шляхів, головний біль.

Побічні реакції. Алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри); альбумінурія, гематурія. При інгаляційному застосуванні можливий бронхоспазм.

Термін придатності. 2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 30 г або по 75 г у пачках або у пачках з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник. ПрАТ «Ліктрави».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності/місцезнаходження заявника та/або представника заявника.

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.