

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ЕВКАЛІПТА НАСТОЙКА

Склад:

діюча речовина: настойка листя евкаліпта (*Eucalypti folium*) (1 : 5) (екстрагент – етанол 70 %);

1 флакон містить настойки листя евкаліпта (*Eucalypti folium*) (1 : 5) (екстрагент – етанол 70 %) – 25 мл.

Лікарська форма. Настойка.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина зеленувато-бурого кольору зі специфічним запахом.

Фармакотерапевтична група. Антисептичні засоби. Код АТХ А01А D11.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Лікарський засіб є звичайним лікарським засобом рослинного походження для застосування відповідно до показань, підтверджених тривалим застосуванням.

Евкаліпта настойка має у своєму складі дубильні речовини, елагову кислоту, флавоноїди, смоли, віск, ефірну олію, до складу якої входять різні терпенові сполуки, особливо активні до грампозитивних, грамнегативних мікроорганізмів, які згубно впливають на гриби та найпростіші. Евкаліпт пригнічує ріст золотистого стафілокока, ешерихій, туберкульозних мікобактерій, трихомонад, дизентерійної амеби. Основним компонентом ефірної олії є цинеолмоноциклічний терпен. Евкаліпта настойка має атисептичну, протизапальну і дезінфікуючу дію, яка зумовлена окиснювальним ефектом цинеолмоноциклічного терпену і протизапальним впливом, пов'язаним практично з усіма фізіологічно активними речовинами, які входять до її складу. Препарат виявляє також помірний седативний (заспокійливий) вплив.

Фармакокінетика.

Не визначалася.

Клінічні характеристики.

Показання.

Запальні захворювання верхніх дихальних шляхів, носоглотки та ротової порожнини (трахеїт, ларингіт, фарингіт, гінгівіт, стоматит), ушкодження шкіри (у тому числі інфіковані рани), а також легкі форми невротичних розладів (дратівливість, емоційна лабільність, порушення засинання та сну).

Протипоказання.

Бронхіальна астма, бронхоспазм. Запальні захворювання шлунково-кишкового тракту та жовчовивідних шляхів. Захворювання печінки тяжкого перебігу. Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Особливості застосування.

Оскільки до складу препарату входить етанол, настойку не рекомендується приймати протягом тривалого часу.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Оскільки до складу препарату входить етанол, настойку не рекомендується вживати внутрішньо жінкам у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

При прийомі “Евкалипта настойки” внутрішньо слід утримуватися від керування транспортними засобами та роботи з потенційно небезпечними механізмами.

Спосіб застосування та дози.

“Евкалипта настойку” приймати внутрішньо, а також застосовувати для полоскання та парових інгаляцій.

Дорослим рекомендується приймати внутрішньо по 15–30 крапель настойки 3–4 рази на день після прийому їжі; дітям віком від 12 років – з розрахунку 1 крапля на 1 рік життя 3–4 рази на день після їди. Для полоскання розвести 10–15 крапель настойки у 200 мл теплої кип’яченої води. Парові інгаляції проводити за допомогою інгаляторів будь-якого типу, застосовуючи “Евкалипта настойку” у нерозведеному стані або після попереднього розведення її водою (як для полоскання). Тривалість застосування препарату залежить від досягнутого лікувального ефекту.

Користувач повинен проконсультуватися з лікарем, якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування лікарського засобу або спостерігаються побічні реакції, не зазначені в інструкції для медичного застосування лікарського засобу.

Діти. Не застосовується внутрішньо дітям віком до 12 років через вміст етанолу.

Передозування. Не встановлено.

Побічні реакції.

Реакції з боку імунної системи: при підвищеній чутливості до препарату можуть виникнути алергічні реакції (у т. ч. кропив’янка, почервоніння та висипи на шкірі, свербіж, набряк Квінке), іноді – контактний дерматит (у ділянці губ).

З боку органів травлення: нудота, блювання та діарея.

При виражених реакціях застосування препарату припиняють.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 25 мл у флаконах.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник. ПРАТ «ФІТОФАРМ».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.

Україна, 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, 2.

Заявник. ПРАТ «ФІТОФАРМ».

Місцезнаходження заявника.

Україна, 02092, місто Київ, вул. Алматинська, будинок 12.