

## ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

### ПІВОНІЇ НАСТОЙКА

#### **Склад:**

*діюча речовина:* настойки рівних співвідношень трави півонії ухильної, кореневищ та коренів півонії ухильної (1:10) (*Paeoniae anomalae herba – Paeoniae anomalae rhizomata et radices* 1:1), (екстрагент – етанол 40 %) – 50 мл;

*допоміжні речовини:* крім екстрагенту, відсутні.

**Лікарська форма.** Настойка.

*Основні фізико-хімічні властивості:* рідина світло-коричневого кольору, гіркого в'яжучого смаку, своєрідного запаху. У процесі зберігання допускається випадання осаду.

#### **Фармакотерапевтична група.**

Снодійні та седативні засоби. Код АТХ N05C M.

#### **Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.* трава, кореневища та корені півонії ухильної містять феноли, дубильні речовини, органічні кислоти. Півонії настойка має спазмолітичні, протисудомні властивості і здатність підвищувати кислотність шлунка та опір організму до гіпоксії.

*Фармакокінетика.* Не вивчалась.

#### **Клінічні характеристики.**

##### **Показання.**

Функціональні порушення центральної нервової системи (нейроциркуляторна дистонія за гіпертонічним типом, невротичні стани).

##### **Протипоказання.**

Артеріальна гіпотензія. Індивідуальна гіперчутливість до біологічно активних речовин, що містяться в лікарській рослинній сировині.

### ***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

Лікарський засіб може потенціювати дію седативних і снодійних засобів, транквілізаторів, нейролептиків, антидепресантів із седативною дією, а також посилює дію алкоголю.

### ***Особливості застосування.***

При тривалому прийомі великих доз лікарського засобу необхідно контролювати шлункову кислотність у пацієнтів з тенденцією до її підвищення.

Перед застосуванням збовтувати.

Не рекомендовано застосовувати лікарський засіб протягом тривалого часу через вміст етанолу.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Протипоказано застосовувати лікарський засіб у період вагітності (діє абортивно) або годування груддю.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

У період лікування «Півонії настойкою» пацієнту слід утримуватися від керування транспортними засобами та виконання іншої роботи, яка потребує підвищеної уваги, швидкості психічних і рухових реакцій.

### ***Спосіб застосування та дози.***

«Півонії настойку» приймати всередину за 10–15 хв до їди, попередньо розчинивши у невеликій кількості води. Дорослим призначати по 15–20 крапель настойки 2–3 рази на добу. Тривалість курсу лікування визначається лікарем індивідуально для кожного пацієнта з урахуванням характеру, ступеня тяжкості та особливостей перебігу захворювання, стабільності досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості лікарського засобу.

Рекомендована тривалість лікування – 2 тижні, у разі необхідності курс лікування можна повторити після перерви (через 2–3 місяці).

Пацієнт повинен проконсультуватися з лікарем, якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування лікарського засобу чи спостерігаються будь-які побічні реакції.

Діти.

Досвіду застосування лікарського засобу дітям немає, тому він не рекомендований до застосування у педіатричній практиці.

***Передозування.***

При перевищенні рекомендованих доз спостерігаються сонливість, зниження артеріального тиску, запаморочення.

У разі передозування слід припинити застосування лікарського засобу і призначити симптоматичну терапію (відповідно до клінічного стану хворого).

***Побічні реакції.***

*З боку центральної нервової системи:* сонливість, загальна слабкість.

*З боку серцево-судинної системи:* артеріальна гіпотензія.

*Місцеві алергічні реакції:* гіперемія та висипання на шкірі, свербіж, набряк.

***Термін придатності.*** 2 роки.

***Умови зберігання.***

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

***Упаковка.***

По 50 мл у флаконах скляних або полімерних.

***Категорія відпуску.*** Без рецепта.

***Виробник/заявник.***

ТОВ «Тернофарм».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності/  
місцезнаходження заявника.**

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Тел./факс: (0352) 521-444, [www.ternopharm.com.ua](http://www.ternopharm.com.ua)