

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ФІАЛКИ ТРАВА

(VIOLAE HERBA)

Склад:

діюча речовина: фіалки трава (*Violae herba*);

1 пачка містить: фіалки трави (*Violae herba*) 50 г або 60 г;

1 фільтр-пакет містить: фіалки трави (*Violae herba*) 1,5 г.

Лікарська форма. Трава.

Основні фізико-хімічні властивості:

подрібнена сировина: шматочки стебел (зеленого, світло-зеленого або жовтувато-зеленого кольору), листків (зеленого кольору), плодів, квіток (фіолетового, синього, темно-синього, жовтого, світло-жовтого, блідо-фіолетового кольору) різної форми та окремі насінини світло-бурого кольору;

порошок крупний: шматочки стебел, листків, квіток, плодів зеленого, світло-зеленого або жовтувато-зеленого кольору з фіолетовими, синіми, темно-синіми, жовтими, світло-жовтими, блідо-фіолетовими вкрапленнями та окремі насінини світло-бурого кольору.

Фармакотерапевтична група. Відхаркувальні засоби.

Код АТХ R05C A.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Біологічно активні речовини препарату чинять антисептичну, протиза-пальну, бронхолітичну, відхаркувальну, слабку діуретичну, жовчогінну і спазмолітичну дію.

Клінічні характеристики.

Показання.

Захворювання верхніх дихальних шляхів, що супроводжуються кашлем з утрудненим відходженням мокротиння (гострі та хронічні бронхіти, бронхопневмонії, коклюш), запальні захворювання нирок і сечового міхура, сечокам'яна хвороба – у складі комплексної терапії.

Протипоказання.

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату або до саліцилатів.
Гломерулонефрит, гепатит.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

1 столову ложку трави помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.

Приймати у теплому вигляді 3-4 рази на добу після їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по 1/3-1/2 склянки, дітям віком 12-14 років – по 1/3 склянки, 7-12 років – по 2 столові ложки, 3-7 років – по 1 столовій ложці. Перед застосуванням настій збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хвилин. Приймати у теплому вигляді 3-4 рази на добу після їди: дорослим та

дітям віком від 14 років – по ½-1 склянці, дітям віком 12-14 років – по ½ склянки,
7-12 років – по ⅓ склянки, 3-7 років – по 2 столові ложки.

Приготовлений настій зберігати при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти.

Препарат застосовувати дітям віком від 3 років.

Передозування.

Передозування та тривале застосування препарату призводить іноді до виникнення нудоти, блювання, діареї, алергічних висипань на шкірі.

Побічні реакції.

При гіперчутливості до препарату можливі алергічні реакції, у т. ч. висипання на шкірі, нудота, блювання, діарея.

При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 50 г або 60 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті № 20 у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник. ПрАТ «Ліктрави».

Місце знаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності/місце знаходження заявника та/або представника заявника.

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.