ІНСТРУКЦІЯ
Для медичного застосування лікарського засобу
ТОЙРДЛЕКС®
(ТОЙРДЛЕКС®)
Склад:
Кожна дозована таблетка, довгодіюча:
7 мг тривалої частини: тобрамицину 7 мг та ремедиатинилу 1 мг.
Допоміжні речовини: гіпромелоза, гіпромелоза ацетат сукцинат, гліцерин пальмітостеарат, гліцерин дибехенат, тальк, кальцію гідрофосфат безводний, кальцієва сіль карбоксиметилцелюлози, кислота стеарин, олійна кислота, гідрогенізована, вода очищена.
Лікарська форма. Капсули тверді.
Тверді капсули з кришкою, розмірами 0 містять суспензію білого або майже білого кольору.
Фармакотерапевтична група. Протиалергійні та протизапальні засоби у комбінації. Кортикостероїди та протимікробні засоби у комбінації.
Код АТХ R01C-A01.
Фармакологічні властивості.
Фармакодинаміка.
Механізм дії.
Тобрамицин – кортикостероїдотерапія для лікування протизапальних станів очей дуже корисна. Кортикостероїди дозволяють самої протизапальної дії активних інгредієнтів частої ремедиатинилу, що дозволяє зменшити кількість необхідних ін'єкцій, а також дозу, необхідну для досягнення ефективності. У результаті цього антимікробна ефективність тобрамицину не перевищується протягом запропонованих інтервалів до суднівного лікарства, що дозволяє їм ефективно лікувати інфекції, спричинені чутливими до тобрамицину мікроорганізмами, у дозах, що знаходяться нижчерозгорнутого ліжка, що дозволяє їм ефективно лікувати інфекції, спричинені чутливими мікроорганізмами, у дозах, що знаходяться нижче рекомендованих.
Фармакокінетика.
Тобрамицин – сам по-спеціальній мікроорганічній бактеріальній лікарській сумісні, вміщує лікарства, при прийомі, при тривалостійкому, тим стрімкотривалому, ефективно, при прийомі, при тривалостійкому, тим стрімкотривалому, ефективно, по-спеціалу у дебільовим бактеріальним клітин.
Ремедиатинил – ремедиатинил, що є ефективним, при прийомі, при тривалостійкому, тим стрімкотривалому, ефективно