

# **ІНСТРУКЦІЯ**

## **для медичного застосування лікарського засобу**

### **КЛІМАКТОПЛАН**

#### **(KLIMAKTOPLAN®)**

#### **Склад:**

*діючі речовини:* 1 таблетка містить: Cimicifuga D2 25 мг, Ignatia D3 25 мг, Sepia D2 25 мг, Sanguinaria D6 25 мг;

*допоміжні речовини:* лактози моногідрат, магнію стеарат, крохмаль пшеничний.

#### **Лікарська форма.** Таблетки.

*Основні фізико-хімічні властивості:* сірі, двоплощинні таблетки зі скосеним краєм, іноді злегка плямисті.

#### **Фармакотерапевтична група.**

Комплексний гомеопатичний препарат. Інші препарати для лікування гінекологічних захворювань. Код ATX G02CX.

#### **Фармакологічні властивості.**

Клімактоплан містить чотири інгредієнти, які зумовлюють ефект препарату.

*Cimicifuga* впливає на гіпоталамус, усуваючи або послаблюючи припливи жару, нервове збудження і депресії. *Sepia* регулює спільні функції гормонів кори надниркових залоз, статевих органів і гіпофіза. *Sepia*, як і *Ignatia*, насамперед діє на психічні реакції, однак вона впливає також на напади пітливості, припливи жару, головний біль і стан знесилля. *Sanguinaria* особливо ефективна при припливах жару, які супроводжуються минущим рум'янцем і прискореним серцебиттям, а також при головному болю типу мігрені.

Отже, Клімактоплан за рахунок поєднання специфічних інгредієнтів лікує комплекс симптомів, типових для клімактеричного періоду. Завдяки добрій переносимості Клімактоплан можна приймати протягом тривалого часу.

#### **Клінічні характеристики.**

## ***Показання.***

Клімактеричні розлади: припливи жару, посилене потовиділення, відчуття серцебиття, запаморочення, свербіж, внутрішнє занепокоєння, порушення сну, депресивний стан, нервова збудливість.

## ***Протипоказання.***

Підвищена чутливість до діючих речовин або до будь-якої з допоміжних речовин лікарського засобу.

## ***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

Дотепер невідома.

Застосування гомеопатичного лікарського засобу не виключає застосування інших лікарських засобів.

Пацієнтам слід проконсультуватися з лікарем, якщо вони приймають або приймали в недавньому минулому будь-які інші ліки, включаючи лікарські засоби, які можна придбати без рецепта.

*Примітка.* Дія гомеопатичних лікарських засобів може бути різною залежно від загальних негативних факторів, пов'язаних із шкідливими звичками (стимулятори: наприклад, кава або чай, алкоголь, куріння).

## ***Особливості застосування.***

Необхідно проконсультуватися з лікарем, якщо стан не покращився або погіршився чи з'явилися додаткові скарги.

Лікарський засіб містить лактозу, тому пацієнти з рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не повинні його застосовувати.

Однією з допоміжних речовин, що входять до складу препарату, є пшеничний крохмаль. У зв'язку з цим таблетки не слід застосовувати пацієнтам з підвищеною чутливістю або непереносимістю глютену.

## ***Застосування у період вагітності або годування груддю.***

Не застосовують у період вагітності та годування груддю.

## ***Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або***

**іншими механізмами.**

Не впливає.

**Спосіб застосування та дози.**

Приймають по 1-2 таблетки 3 рази на день. Максимальна добова доза становить 6 таблеток. Таблетки приймати за півгодини до їди або через півгодини після їди, повільно розсмоктуючи в ротовій порожнині. Якщо необхідно, таблетки можна розчинити в невеликій кількості води. У разі покращення дозування слід зменшити. Клімактоплан слід застосовувати не менше 3 місяців. Лікування може бути продовжено у разі необхідності.

**Діти.**

Не застосовують дітям.

**Передозування.**

Передозування не спостерігалось.

**Побічні реакції.**

При застосуванні препарату можливі реакції гіперчутливості, можуть виникнути менструальні та носові кровотечі або збільшитися частота менструальних кровотеч.

*Примітка.* При застосуванні гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове погіршення наявних симptomів захворювання (первинне погіршення). У цьому випадку необхідно припинити застосування препарату і проконсультуватися з лікарем.

У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід звернутися за консультацією до лікаря. Це стосується усіх можливих побічних реакцій, зокрема не описаних у цій інструкції.

**Термін придатності.** 5 років.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.**

Зберігати при температурі не вище 25 °C в сухому, недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 20 таблеток у блістері; по 3 або 5 блістерів у картонній коробці.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.

**Виробник.**

Дойче Хомеопаті-Уніон ДХУ-Арцнайміттель ГмбХ & Ко. КГ/

*Deutsche Homoeopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG.*

або

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ/

*Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG*

**Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.**

Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруе, Німеччина/

*Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Germany.*

або

Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах, Німеччина

*Steinenfeld 3, 77736 Zell am Harmersbach, Germany*