

# I Н С Т Р У К Ц І Я

для медичного застосування лікарського засобу

АСІНІС<sup>®</sup>

(ASINIS<sup>®</sup>)

**Склад:**

*діючі речовини:* 100 мл препарату містить: Armoracia D1 10 мл, Kalium bichromicum D6 10 мл, Hydrastis D6 10 мл, Calcium sulfuricum D12 10 мл, Cinnabaris D12 10 мл;

*допоміжні речовини:* етанол 43 % (м/м), вода очищена.

1 мл розчину містить 25 крапель.

**Лікарська форма.** Краплі оральні.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозора від безбарвного до ледь жовтуватого кольору рідина.

**Фармакотерапевтична група.** Комплексний гомеопатичний засіб.

**Фармакологічні властивості.**

**Фармакодинаміка.**

Препарат має комплексну лікувальну дію, зумовлену поєднанням та взаємним посиленням дії активних компонентів. Чинить протизапальну, протиабрякову, секретолітичну та секретомоторну дії, а також імуномодулюючий і репаративний ефекти.

Препарат зменшує місцеві ексудативні прояви, усуває набряк та гіперемію слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, не спричиняючи подразнення, реактивної гіперемії або відчуття сухості у носовій порожнині. Сприяє розрідженню та відходженню патологічно густого слизу. Відновлює функціонування мукоциліарного кліренсу, а саме - прискорює очищення слизової оболонки від гнійно-слизових виділень та кірок, прискорює процеси загоєння, посилює резистентність слизової оболонки до проникнення патогенних бактерій і вірусів. Знижує ризик розвитку гнійних ускладнень гострого катарального риносинуситу.

Не викликає звикання при тривалому застосуванні.

Усуває прояви астенічного симптомокомплексу інфекційно-токсичного та гіпоксичного генезу. Підвищує неспецифічну реактивність організму до інфекцій, у тому числі при застосуванні антибактеріальної терапії, та запобігає повторним загостренням синуситу,

риніту.

**Фармакокінетика.**

Не досліджувалася.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Лікування гострих та хронічних риносинуситів (гайморитів, фронтитів, етмоїдитів, сфеноїдитів, комбінованих синуситів). Хронічні риніти та ларинготрахеїти. У комплексному лікуванні запальних захворювань середнього вуха (у т.ч. середнього отиту, евстахіїту).

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до хрому або до будь-якої діючої чи допоміжної речовини препарату.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

На даний час немає інформації відносно взаємодії препарату з іншими лікарськими засобами.

При застосуванні Асініс<sup>°</sup> у комплексній терапії разом з іншими препаратами рекомендовано дотримуватися 20-хвилинної перерви між прийомом лікарських засобів.

Нездоровий спосіб життя, вживання стимуляторів, неправильне харчування можуть негативно впливати на ефективність гомеопатичних лікарських засобів.

**Особливості застосування.**

Асініс<sup>°</sup> краплі оральні не слід застосовувати пацієнтам з алкогольною залежністю, оскільки в одній дозі препарату (5/10 крапель) міститься 80/160 мг спирту.

Вміст спирту слід враховувати також при застосуванні препарату вагітним, жінкам, які годують груддю, дітям та пацієнтам з високим ризиком захворювань печінки та ризиком нападів епілепсії.

При підвищенні температури, появі кров'янистих або гнійних виділень необхідно проконсультуватися з лікарем.

На початку лікування препаратом можуть тимчасово загострюватися наявні симптоми захворювання (первинна реакція). Така реакція зазвичай не є шкідливою. Якщо симптоми не зникають, застосування препаратору потрібно припинити. Після зникнення первинної реакції лікарський засіб можна застосовувати знову. При повторному загостренні симптомів застосування лікарського засобу повинно бути припинене.

Довготривале лікування гомеопатичними лікарськими засобами має контролювати лікар з досвідом застосування гомеопатичних препаратів, оскільки можуть виникнути симптоми, які не вказані в інструкції для медичного застосування.

Асініс<sup>0</sup> краплі оральні містить сліди лактози моногідрату. Ця кількість не представляє ризику для пацієнтів із непереносимістю лактози. Пацієнтам з рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не слід приймати цей препарат.

Завдяки комплексній дії препаратору Асініс<sup>0</sup> ризик розвитку ларингоспазму у дітей відсутній. Відсутність покращання стану протягом 5-7 днів самостійного лікування свідчить про можливе неправильне застосування препаратору, у цьому випадку Вам необхідно звернутися до лікаря за додатковою консультацією.

Оскільки Асініс<sup>0</sup> містить рослинні та інші природні компоненти, при зберіганні може спостерігатися незначна зміна смаку, прозорості або кольору розчину, що не призводить до зниження якості та ефективності препаратору.

**Застосування у період вагітності або годування груддю.** Дані щодо застосування лікарського засобу у період вагітності або годування груддю відсутні. Доказів будь-якого ризику прийому препаратору у період вагітності або годування груддю немає. Препаратор застосовують у період вагітності або годування груддю у випадках, якщо, на думку лікаря, очікувана користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

*Дані щодо впливу препаратору на репродуктивну функцію відсутні.*

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.** Лікарський засіб не впливає або має зовсім незначний вплив на здатність керувати транспортними та механічними засобами.

### **Спосіб застосування та дози.**

*Дорослі та діти віком від 12 років:* по 10 крапель препаратору розведеного в невеликій кількості води;

*діти віком від 3 до 12 років:* по 5 крапель препаратору, розведеного в невеликій кількості води.

Приймати 3 рази на добу.

На початку лікування, а також у випадках, що вимагають швидкого ослаблення симптомів, можливий прийом препаратору кожні півгодини-годину до 8 разів на добу до покращання стану, але не більше 3-х діб, після чого застосовувати 3 рази на добу.

Для досягнення максимального ефекту Асініс<sup>0</sup> рекомендується застосовувати у проміжках між прийомами їжі (за 30 хвилин до або через 1 годину після їди). Для посилення ефективності рекомендується потримати препаратор деякий час у роті перед проковтуванням.

При погіршенні симптомів, або у випадку, якщо покращення не наступає після 7 днів лікування необхідно проконсультуватися з лікарем.

#### *Курс лікування.*

При гострому риносинуситі основний курс лікування - 1-2 тижні.

Лікування хронічного риніту, синуситу або ларинготрахеїту залежно від перебігу та тривалості захворювання - 1-2 місяці.

Профілактика загострень хронічного синуситу або ларинготрахеїту у періоди підвищення захворюваності на гостру респіраторну вірусну інфекцію або грип - 1-1,5 місяці.

При необхідності курс можна повторити (після консультації з лікарем).

**Діти.** Лікарський засіб можна призначати дітям віком від 3 років.

Досвід застосування дітям віком до 3 років до цього часу відсутній.

**Передозування.** Випадків передозування не було зареєстровано.

**Побічні реакції.** У виняткових випадках в осіб із гіперчутливістю на будь-який компонент препарату можливе виникнення алергічних реакцій.

У поодиноких випадках можуть спостерігатися реакції з боку шкіри, підвищене слизовиділення. У таких випадках застосування препарату повинно бути припинене. Немає інформації відносно частоти виникнення побічних реакцій.

**Термін придатності.** 5 років.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.** Лікарський засіб зберігати у щільно закритому флаконі в оригінальній картонній упаковці при температурі не вище 30 °C у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** По 20 мл або по 50 мл, або по 100 мл у флаконах-крапельницях із темного скла, у картонній упаковці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник.**

Ріхард Біттер АГ.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

Occiaxerштрасе 7, A-9560 Фельдкірхен, Австрія.