

# ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

**АльпеКід Дормі**

**(AlpeKid® Dormi)**

**Склад:**

*діючі речовини:* 1 таблетка містить *Cypripedium pubescens D4* 15 мг; *Magnesium carbonicum D10* 20 мг; *Zincum valerianicum D12* 15 мг;

*допоміжні речовини:* мікрокристалічна целюлоза, тальк, лактози моногідрат, магнію стеарат.

**Лікарська форма.** Таблетки.

*Основні фізико-хімічні властивості:* білого або майже білого кольору двоплощинні таблетки зі скошеною кромкою.

**Фармакотерапевтична група.** Комплексний гомеопатичний препарат.

**Фармакологічні властивості.**

Активні компоненти препарату ефективні при таких симптомах як нервозність, дратівливість, відчуття тривожності.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Стани занепокоєння, збудження та безсоння у дітей віком до 6 років.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Невідома.

Застосування даного гомеопатичного лікарського засобу не виключає застосування інших

лікарських засобів.

### ***Особливості застосування.***

При застосуванні гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове первинне погіршення. У цьому випадку слід припинити прийом препарату і проконсультуватися з лікарем.

Препарат містить лактозу. Пацієнтам із рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не слід застосовувати препарат.

При відсутності поліпшення після 2-3 тижнів лікування або при частому повторенні симптомів слід припинити прийом препарату і проконсультуватися з лікарем.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Препарат призначений для застосування дітям.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.* Препарат призначений для застосування дітям.

### ***Спосіб застосування та дози.***

Дітям від народження до 6 років: по 1 таблетці 4 рази на добу.

Курс лікування: 2-4 тижні.

Таблетки слід приймати за 30 хвилин до або через 30 хвилин після їжі, повільно розсмоктуючи їх у ротовій порожнині. При лікуванні немовлят таблетки можна розчинити у невеликій кількості води (наприклад, у чайній ложці).

*Діти.* Препарат застосовують дітям від народження до 6 років після консультації з лікарем.

***Передозування.*** У випадках передозування можливе підвищення частоти виникнення побічних реакцій.

***Побічні реакції.*** Можливі алергічні реакції. При виникненні будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

**Термін придатності.** 5 років.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.** Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 150 таблеток у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці.

або

По 30 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній коробці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник.**

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ/

Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах, Німеччина

Steinenfeld 3, 77736 Zell am Harmersbach, Germany